


測試丙肝 可救你一命

丙型肝炎可致肝癌


丙型肝炎是由丙型肝炎病毒感染所引起的肝臟疾病。
慢性丙型肝炎可引致肝硬化及肝癌。



感染丙型肝炎病毒後可持續數十年都沒有症狀，
直至肝臟已被嚴重損害後才出現徵狀。


丙型肝炎很容易經接觸感染者的血液而傳播，共用
針咀、針筒或其他器具注射毒品可傳染丙型肝炎病毒。

在香港，估計超過六成的注射毒品人士曾經或現時患有
丙型肝炎。



診斷丙型肝炎須透過血液測試

現時或曾經注射毒品人士，包括在多年前只注射過一次或數次毒品的人士，無論
有沒有症狀，均應接受丙型肝炎測試。



* 篩檢測試：抗體測試判斷曾否感染丙型肝炎病毒

** 確認測試：核酸測試判斷現時是否帶有丙型肝炎病毒

口服藥物可治癒丙型肝炎

服用直接抗病毒藥物約8 - 12個星期可治癒丙型肝炎（即可「斷尾」），從而降低發展成肝癌及因肝臟疾病致死的風險。

- 👍 療效顯著
- 👍 副作用少
- 👍 口服藥物（無需注射）



保護自己免受丙型肝炎病毒感染

丙型肝炎患者服用藥物康復後，並不會有具保護性的免疫力，故仍然需要注意以下事項：

⚠️ 停止注射毒品


- ✦ 接受美沙酮治療
- ✦ 用過的針咀可能沾有血液，即使是難以用肉眼察覺到的極少份量，溶於水中時亦可污染器皿及其他器具（如濾紙及匙羹），構成傳播丙型肝炎病毒的風險



⚠️ 避免與他人共用剃刀及牙刷等有機會受血液污染的個人護理用品



✅ 進行性行為時使用安全套



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health

2023年9月