


病毒性肝炎的預防



內容大綱

簡介肝炎

甲型肝炎

乙型及丙型慢性肝炎

傳播途徑

及早檢測及早醫治

預防方法



認識肝臟



我是人體的重要器官，每天二十四小時工作

分泌功能

- 分泌膽汁，促進脂肪及脂溶性維生素A、D、E、K的吸收

代謝功能

- 將糖類合成為肝醣，及將肝醣轉化為葡萄糖
- 將胺基酸合成為蛋白質
- 將舊的紅血球分解，保留鐵質，膽紅素則排出體外

解毒功能

- 處理由體內新陳代謝產生的有毒物質，以及外來的毒素，如酒精、藥物等

肝炎的種類及成因

「肝炎」= 肝臟細胞發炎

肝炎的成因：


- ❖ 病毒感染（最為常見）
- ❖ 脂肪肝
- ❖ 酒精、藥物、化學劑和遺傳病等



病毒性肝炎


現時有五種肝炎病毒

甲 戊



腸道傳染 (食物傳染)

乙 丙 丁



血液 / 體液傳染

感染肝炎病毒後可引致**急性肝炎**
乙型及丙型肝炎可發展為**慢性肝炎**

急性肝炎的徵狀

- 每種病毒性肝炎的潛伏期長短不一，由二星期至六個月不等
- 不同的肝炎病毒引起的肝炎病徵皆類似，一般**難以單從症狀辨別出肝炎成因**，透過**血液檢測**才可確定病因



發熱



疲倦無力




噁心



食慾不振



黃疸



上腹不適




嘔吐



肚瀉、茶色小便

甲型肝炎

- ❖ 潛伏期一般是 14 – 28 日
- ❖ 成人出現病徵的情況較兒童多
- ❖ 病情在年紀較大的人士中較為嚴重，患者可能需要數星期或數月的時間康復
- ❖ 沒有特定藥物醫治，主要是舒緩不適和保持營養均衡，包括補充因嘔吐和腹瀉而流失的水分
- ❖ 甲型肝炎痊癒後，一般可獲終生免疫，不會發展為慢性肝炎



甲型肝炎傳播途徑

甲型肝炎病毒主要是通過**糞口途徑**傳播，即透過**進食**或**接觸**受感染者糞便**污染的食物、水或物件而傳播**

進食未經徹底煮熟的受污染介貝類水產動物
(尤其是蠔、蜆、貽貝和扇貝等)

飲用被病毒污染而未經妥善處理的食水

甲型肝炎病毒可在淡水或鹹水生存達12個月之久，
亦可生存於食物內數天以上



甲型肝炎傳播途徑

與感染者有**緊密接觸**或
性接觸（不限於肛口接觸）
亦可傳播甲型肝炎病毒

甲型肝炎與你「食」「色」相關 Hepatitis A and You

以下行為可令你感染甲型肝炎：

You may get Hepatitis A infection through:



接種甲型肝炎預防疫苗有效預防感染甲型肝炎

詳情請向醫護人員查詢


Hepatitis A vaccination is an effective means to prevent hepatitis A infection

For further information,
please contact our medical or nursing staff


甲型肝炎流行情況

在 香港，甲型肝炎的感染率屬於低，每年呈報的甲型肝炎個案由 1988 年超過一千宗下降至最近幾年平均少於一百宗

在 1992 年曾發生甲型肝炎流行疫症，
呈報數字高達 3626 人，其中 4 人病重死亡



甲型肝炎流行情況



甲型肝炎流行情況


衛生署綜合治療中心就診的愛滋病毒陽性的男男性接觸者當中，
甲型肝炎的個案自2016年8月起異常增加

沒有於病人間發現涉及同一食物或水源

參考外地經驗、本地流行病學和化驗調查，
相信這次甲型肝炎個案爆發可能是
透過男男性接觸而人傳人感染



2015年7月至2017年11月期間已知屬男男性接觸者的甲型肝炎個案分佈




自2017年2月3日
推出控制措施，為
男男性接觸者免費
接種甲型肝炎疫苗

甲型肝炎流行情況

涉及男男性接觸者的甲型肝炎爆發自2017年8月起回落至低水平
(每月1宗或以下)

流行病學總結 (2015年9月 – 2017年11月24日)

- 53宗個案，介乎20至55歲
- 45人 (~85%) 需要入院治療，沒有死亡個案
- 36人 (~70%) 屬愛滋病病毒感染者
- 51人 (>95%) 未曾接種過甲型肝炎疫苗
- 13人 (~25%) 同時感染其他性病 (如梅毒、衣原體感染和淋病)



自2017年2月3日
推出控制措施，為
男男性接觸者免費
接種**甲型肝炎疫苗**

甲型肝炎疫苗

十分安全，有效

接種第一劑甲型肝炎疫苗後一個月，約有95%的人士可以產生免受感染的保護性抗體

共需注射兩劑疫苗

高感染風險群組人士應考慮接種疫苗



前往甲型肝炎流行地區的外遊人士



男男性接觸者



患有慢性肝病的人士



患有凝血因子疾病而需要接受血漿衍生凝血因子替代治療人士

預防甲型肝炎

個人衛生，預備食物前及進食前應洗手，
如廁後要沖廁及用肥皂洗手



飲食衛生，食水飲用前要煮沸，所有食物，
特別是蠔、蜆、貽貝和扇貝等雙殼類水產，
都應清洗乾淨並徹底煮熟



環境衛生，適當處理污水及排泄
物，妥善處理及儲存食水，保持廚
房及食具清潔



內容大綱

簡介肝炎

甲型肝炎

乙型及丙型慢性肝炎

傳播途徑

及早檢測及早醫治

預防方法



急性乙型及丙型肝炎

乙型肝炎

- 👉 潛伏期可長達6個月，平均是 75 日
- 👉 大多數新感染乙型肝炎的嬰兒和幼童都沒有明顯症狀
- 👉 較年長的兒童或成人有30 - 50%會出現與其他肝炎相類似的症狀




丙型肝炎

- 👉 潛伏期可長達6個月，一般是 6 – 9 個星期
- 👉 大多數新感染丙型肝炎病毒的患者都沒有明顯症狀

乙型及丙型肝炎傳播途徑

1

母嬰接觸




2

血液接觸



3

性接觸



母嬰傳播

乙型肝炎

- 主要的傳播途徑，亦是乙型肝炎在香港流行的主要原因
- 若初生嬰兒受到感染，有九成機會發展為慢性乙型肝炎



丙型肝炎

- 不常見，母嬰傳播風險估計為 4 - 8%



血液接觸傳播



擦傷的皮膚、眼睛或口部的黏膜接觸到感染者的血液或體液



共用器具注射毒品



用未經妥善消毒的器具穿耳、紋身、針灸等



共用日用品如剃刀、指甲鉗等容易令身體受損的用具



重用未被徹底消毒的醫療器械




輸入未經篩查的血液及血液製品

性接觸傳播


乙型肝炎

- 能有效透過同性或異性性接觸而傳播
- 高風險人群：未接種疫苗的男男性接觸者 和 有多個性伴侶 或 從事性工作的異性性接觸者



丙型肝炎

- 經性接觸而傳播的情況並不常見
- 若性伴侶雙方都有皮膚或黏膜破損，在沒有使用安全套的情況下進行性行為會有機會傳播丙型肝炎病毒，尤其是進行可導致血液接觸的性行為



傳播途徑

不會經一般社交接觸而傳播

共用食具、共膳



擁抱、握手、接吻




咳嗽



慢性肝炎

若感染乙型或丙型肝炎病毒後
不能在**6個月**內完全清除病毒，
則被視為**慢性感染**



乙型肝炎

- 慢性乙型肝炎屬**終身感染**
- 患者的年紀愈小，感染後發展為慢性乙型肝炎的機會則愈大
 - 若**初生嬰兒**受到感染，有**90%**機會發展為慢性乙肝
 - 約5%的成年人感染後會成為慢性乙肝患者

丙型肝炎

- 約 **70%** 患者感染後會發展為慢性肝炎

慢性肝炎可引致嚴重肝臟疾病


- ❖ 感染乙型或丙型肝炎病毒後可持續數十年都沒有症狀，直至肝臟已被嚴重損害後才出現徵狀
- ❖ 慢性乙型或丙型肝炎都可引致**肝硬化**及**肝癌**



香港的肝癌病人中，
約有**80%**屬乙肝患者，約有**7%**屬丙肝患者

乙型肝炎的流行情況

根據於2015-16年由香港大學進行的流行病學研究，
約 **7.2%** 的香港人口感染乙型肝炎病毒



7.2%

在香港，估計有約**54萬人**患有乙型肝炎

丙型肝炎的流行情況

約 0.3% 的香港人口感染丙型肝炎病毒
估計約 2.2 萬人患有丙型肝炎



丙型肝炎在某些特定群組中較為普遍



注射毒品人士
(> 60%)




愛滋病病毒感染者 (~ 9%)

丙型肝炎的流行情況


近年在**感染愛滋病病毒的男男性接觸者**中
丙型肝炎感染愈見普遍



同時感染愛滋病病毒及丙型肝炎病毒的病例時序分佈



診斷乙型及丙型肝炎



必須透過**血液測試**，
無法單從徵狀來確定

較高感染風險的人士應進行測試




注射毒品人士




經常接受血液或
血液製品的人士



愛滋病病毒
感染者




男男性接觸者



洗腎人士

乙肝患者的家庭成員和性伴侶 應進行乙型肝炎測試



診斷乙型肝炎

測試結果		臨床詮釋
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)	乙型肝炎表面抗體 (anti-HBs)	
陽性 (+)	陰性 (-)	乙肝病毒感染， 應盡快尋求醫學評估
陰性 (-)	陽性 (+)	沒有感染乙肝病毒，並已有足夠抗體 保護身體免受乙肝病毒感染
陰性 (-)	陰性 (-)	沒有感染乙肝病毒及沒有乙肝免疫力， 應考慮接種乙肝疫苗

感染乙型肝炎病毒後，若表面抗原(HBsAg)
呈陽性反應超過六個月，即確診患有慢性乙型肝炎


診斷丙型肝炎

丙型肝炎病毒抗體 (anti-HCV)

作為篩檢測試以判斷測試者
曾否感染丙型肝炎病毒

丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)


作為確認測試以判斷測試者
現時是否帶有丙型肝炎病毒



丙型肝炎病毒抗體測試及核酸測試
均呈陽性反應的人士，即確診患有丙型肝炎

治療乙型肝炎

- 抗病毒藥物能有效抑制乙肝病毒複製，減低患上肝硬化及肝癌的風險
- 醫生會根據慢性乙型肝炎患者的個別情況作詳細評估，以決定何時需要抗病毒藥物治療
- 慢性乙型肝炎患者須定期覆診及進行檢查，如抽血檢驗肝功能、甲胎蛋白及病毒量，及進行肝臟超聲波檢查，以及早察覺及處理肝臟的變化



治療丙型肝炎

- 服用直接抗病毒藥物可治癒丙型肝炎，清除病毒 = 「斷尾」
- 減低發展成肝硬化、肝癌及因肝臟疾病致死的風險
- 口服藥物
- 副作用少
- 療程一般約8-12週
- 丙型肝炎患者服用藥物康復後，並不會有具保護性的免疫力，
故仍然需要採取適當的措施預防再次感染



預防乙型及丙型肝炎

⚠ 停止注射毒品

- ◇ 接受美沙酮治療
- ◇ 用過的針咀可能沾有血液，即使是難以用肉眼察覺到的極少份量，溶於水中時亦可污染器皿及其他器具（如濾紙及匙羹），構成傳播肝炎病毒的風險



⚠ 避免於性行為前及進行期間使用毒品 (chemsex)

⚠ 避免與他人共用剃刀及牙刷等 有機會受血液污染的個人護理用品



✓ 進行性行為時使用安全套

✓ 處理任何皮膚損傷時應戴上手套，並妥善包紮


乙型肝炎疫苗

🍀 最有效預防乙型肝炎的方法

95% 以上的接種者可以產生保護性抗體



注射三次



🍀 接種乙型肝炎疫苗前，可先驗血了解自己的感染及免疫情況
如果現時已感染乙肝病毒，接種預防疫苗亦無效用

香港於1988年開始為全港初生嬰兒接種乙肝疫苗

乙型肝炎免疫球蛋白注射


所有**乙肝孕婦所生的嬰兒**，須於出生後24小時內接受乙型肝炎免疫球蛋白注射，以提供即時的**額外保護**



用作暴露後預防治療（如針刺意外後）



現時並**沒有**可預防**丙型肝炎**的**疫苗**



衛生署社會衛生服務




社會衛生服務屬下有性病診所，負責治療護理、預防及控制性病

- 合資格人士費用全免；毋須預約或醫生介紹信
- 為男男性接觸者提供**乙型及丙型肝炎測試**
- 為有需要的男男性接觸者提供**甲型肝炎疫苗接種**

提供社會衛生科(男性)服務的診所	地址	電話號碼
灣仔男性社會衛生科診所	香港灣仔皇后大道東284號 鄧志昂專科診療院6字樓	3103 2400
油麻地男性社會衛生科診所	九龍油麻地炮台街1 4 5號 油麻地賽馬會分科診療所4字樓	2359 4377
容鳳書社會衛生科診所	九龍觀塘茶果嶺道79號 容鳳書紀念中心4字樓	2727 8315
屯門社會衛生科診所	新界屯門屯利街4號 屯門眼科中心5樓	2459 2958
粉嶺社會衛生科診所	新界粉嶺璧峰路2號 粉嶺健康中心6字樓	2639 1437
柴灣社會衛生科診所	香港柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素 醫院專科門診大樓地庫5樓西翼	2595 7500

診症時段請瀏覽: www.dh.gov.hk/tc_chi/tele/tele_chc/tele_chc_shcm.html


比較甲、乙、丙型肝炎

	甲型肝炎	乙型肝炎	丙型肝炎
傳播途徑 	進食或接觸受感染者糞便污染的食物、水或物件	接觸感染者的血液及體液	
		母嬰傳播最為常見	以經注射毒品等血液接觸傳播較為常見
引致慢性肝炎	不會	會	會
疫苗 	有	有	沒有
治療 	沒有特定藥物，以支援性治療為主	定期監察及透過藥物治療控制病情	利用藥物治療(即可「斷尾」)
抗體保護力 	康復後通常會終身免疫	從疫苗接種或急性肝炎康復後所獲得的抗體可保護身體免受感染	丙型肝炎病毒抗體不能預防身體再次感染

甲乙丙肝 – 你要知


1

感染乙型或丙型肝炎病毒可引致慢性肝炎，
能演變為肝硬化及肝癌



2

較高感染風險的人士應及早檢測 及早醫治




3

甲型及乙型肝炎疫苗能有效預防感染



4

直接抗病毒藥物能有效治癒丙型肝炎
（「斷尾」），但不能預防身體再次感染



5

應採取適當的措施預防感染肝炎病毒





世界肝炎日 7.28



Every 30 seconds
someone loses
their life to
hepatitis B or C.

Don't Wait!
Get tested
at a health
facility
near you.



I CAN'T WAIT

The sooner I know if I have hepatitis, the better chance I have of a long and healthy life.

Don't wait. Get tested.



World Hepatitis Day
28 July
#WorldHepatitisDay
worldhepatitisday.org



I CAN'T WAIT TO GET TREATED

I know that hepatitis is the leading cause of liver cancer. Starting treatment on time is the best way to protect myself.

Don't wait. Speak to your health professional.



World Hepatitis Day
28 July
#WorldHepatitisDay
worldhepatitisday.org





世界肝炎日 7.28




「乙肝無聲致肝癌 及早檢測及早醫」短片





Hepatitis B can cause cancer
Get tested and treated early



**慢性乙型肝炎患者的家庭成員和性伴侶及
感染風險較高的人士應及早檢測！**
Family members and sexual partners of people with chronic hepatitis B and
people at higher risk of infection should get tested early!




www.hepatitis.gov.hk

請瀏覽影片
Please enjoy the videos



乙型肝炎你要知

What you need to know about hepatitis B



甚麼是乙型肝炎？

- 乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的肝臟疾病
- 大多數新感染乙型肝炎的嬰兒和兒童沒有明顯症狀，而年長的兒童感染後有30% - 50%會出現與其肝臟疾病相似的症狀，例如：發燒、疲勞、食慾不振、腹心、嘔吐、上腹部不適、茶色小便及黃疸（皮膚和眼白發黃）
- 約20%患者能清除病毒而轉為慢性乙型肝炎表面抗原，受感染者的年齡越小，轉為慢性高
- 若幼童感染後到成年，有九成機會發展為慢性乙型肝炎
- 約5%的成年人感染後會成為慢性乙型肝炎患者
- 15% - 40%的慢性乙型肝炎患者會逐漸出現肝硬化或肝癌，患者可能沒有症狀，直至肝臟嚴重損傷後才出現症狀



- 乙型肝炎 慢性肝炎 肝硬化 肝癌
- 香港的肝病患者中，約八成屬乙型肝炎患者
- 自一九八八年起，香港實施兒童普及乙型肝炎疫苗接種計劃，能大大減低感染乙型肝炎病毒的機會

乙型肝炎是怎樣傳播？

母嬰傳播

患有乙型肝炎的母親於分娩期間可把病毒傳播給嬰兒，在慢性乙型肝炎流行的地區，大部份患者是經母嬰傳播感染乙型肝炎。



接觸感染者的血液或體液

- 傷傷的皮膚、眼睛或口部的黏膜接觸到感染者的血液或體液
- 與他人共用針筒
- 用未經妥善消毒的器具穿耳、紋身、針灸等
- 共用剃刀、指甲钳等有機會受血液污染的用具
- 使用未經妥善消毒之醫療器械
- 輸入受污染的血液或血液製品

性接觸

在沒有使用安全套的情況下和感染者進行性接觸

乙型肝炎病毒不會經母乳餵哺或一般社交接觸（如共用餐具、共膳、擁抱、握手及接吻等）而傳播



較高感染風險的人士應進行乙型肝炎測試

被視為較高感染風險的人士包括：

- 慢性乙型肝炎患者的家庭成員（如父母、兄弟姊妹及子女）和性伴侶
- 注射毒品人士
- 男男性接觸者
- 愛滋病毒感染者
- 經常接受血液或血液製品的人士
- 洗腎人士
- 工作上會接觸病人血液或血液製品的醫護人員

測試一般包括乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 和乙型肝炎表面抗體 (anti-HBs) 的血液測試，以分別評估乙型肝炎感染及免疫情況。


測試結果		臨床解釋
乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)	乙型肝炎表面抗體 (anti-HBs)	
陽性 (+)	陽性 (+)	乙型肝炎病毒感染、急性感染或慢性感染。若乙型肝炎表面抗原與抗體反應超過六個月，則表示已感染慢性乙型肝炎病毒。
陽性 (+)	陰性 (-)	沒有感染乙型肝炎病毒，並已有抗體保護能避免乙型肝炎病毒感染。
陰性 (-)	陰性 (-)	沒有感染乙型肝炎病毒及沒有乙型肝炎免疫力，應考慮接種乙型肝炎疫苗。

如何治療乙型肝炎？

- 抗病毒藥物能有效抑制乙型肝炎病毒，降低血中肝酶及肝纖維化，改善肝臟的風險
 - 醫生會根據慢性乙型肝炎患者的個別情況進行詳細評估，以決定何時開始抗病毒藥物治療
 - 慢性乙型肝炎患者若出現疲勞及進行相關檢查，如抽血檢驗肝酶、肝臟硬度等檢查，及進行肝臟組織化驗等，以及考慮接受肝臟組織的變化
- ### 如何預防感染乙型肝炎病毒？
- 接種乙型肝炎疫苗，使身體產生免疫
 - 避免任何血液傳染
 - 處理任何出血傷口應戴上手套，並套置針筒
 - 切勿與別人共用剃刀、指甲剪等有機會受血液污染的用具
 - 切勿與他人共用針筒針頭或其他注射用具
 - 採取安全行為及正確使用安全套
 - 血液受污染或血液污染過的物品若棄上垃圾桶，及使用家用漂白白水消毒

如欲進行乙型肝炎測試，請諮詢家庭醫生

www.hepatitis.gov.hk



「丙型肝炎可致肝癌 及早檢測及早醫治」短片



丙型肝炎你要知

What you need to know about hepatitis C



甚麼是丙型肝炎？

丙型肝炎是由丙型肝炎病毒引起的肝臟疾病。
約七成的丙型肝炎病毒感染會發展為慢性肝炎，
並可引致肝硬化及肝癌。



大多數新感染丙型肝炎的患者都沒有明顯
症狀，部分急性患者或會出現與其他肝炎類似的
症狀，如發燒、疲倦、食慾不振、噁心、
嘔吐、上腹部不適、茶色小便及黃疸（皮膚和
眼白發黃）。

丙型肝炎是怎樣傳播？

丙型肝炎病毒最常透過接觸感染者的血液而
傳播：



丙型肝炎病毒不會經一般社交接觸（如共用
食具、共膳、擁抱、握手及接吻等）而傳播。

丙型肝炎能經性接觸而傳播嗎？

經性接觸而傳播丙型肝炎的情況並不常見。
不過，若性伴侶雙方都有皮膚或黏膜破損，在
沒有使用安全套的情況下進行性行為會有機會
傳播丙型肝炎病毒，尤其是進行可導致血液
接觸的性行為。

丙型肝炎會由母親傳給嬰兒嗎？

丙型肝炎病毒可由母親傳給嬰兒，但並不常見。
◆ 母嬰傳播風險估計為 4 - 8%。
◆ 若母親同時感染愛滋病病毒，母嬰傳播的風險
會高 2 至 4 倍。

患有丙型肝炎的母親可以餵哺母乳嗎？

✓ 患有丙型肝炎的母親可以
餵哺母乳。

現時沒有證據顯示丙型肝炎病毒
會經母乳傳播給嬰兒；不過，
若乳頭破損及流血，應停止餵哺
母乳，直至乳頭傷口癒合。



誰具較高感染風險？

估計約 0.3% 的香港人口患有丙型肝炎，但在
某些特定群組中較為常見。



如何診斷丙型肝炎？

感染丙型肝炎病毒後可持續數十年
都沒有症狀，直至肝臟已被嚴重
損害後才出現徵狀。

診斷丙型肝炎必須透過血液測試。



如何治療丙型肝炎？

服用直接抗病毒藥物約 8 - 12 個星期可治療
丙型肝炎（即可「斷尾」），從而降低發展成
肝硬化及因肝臟疾病致死的風險。

- 療效顯著
- 副作用少
- 口服藥物（毋須注射）



請注意：

丙型肝炎患者服用藥物康復後，並不會有具
保護性的免疫力，故應停止進行高風險行為，以
預防再次感染丙型肝炎病毒。

www.hepatitis.gov.hk
肝炎熱線 2112 9911



《2020 - 2024年香港病毒性肝炎行動計畫》 短片



衛生署控制病毒性肝炎辦公室網站

www.hepatitis.gov.hk




The screenshot shows the website of the Viral Hepatitis Control Office (VHCO). The header includes the VHCO logo, the text '香港特別行政區政府 衛生署 控制病毒性肝炎辦公室', and navigation links for home, accessibility, English, and a share icon. A search bar is also present. Below the header is a horizontal menu with links: '關於我們', '行動計劃', '甚麼是肝炎', '乙型肝炎母嬰傳播', '肝炎疫苗', '問與答', '資源', '消息與活動', and '醫護專業'. The main content area features a large green banner with the text '2020 - 2024 年 香港病毒性肝炎行動計劃 Hong Kong Viral Hepatitis Action Plan 2020 - 2024'. The banner includes a graphic of a liver and a syringe on the left, and a hexagonal pattern with icons on the right.




健康教育資源 – 甲型肝炎

類別	標題	連結	封面
海報	<u>甲型肝炎疫苗</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/poster2020_1.pdf	
單張	<u>甲型肝炎疫苗</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/leaflet2020_1.pdf	
單張	<u>預防甲型肝炎</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/leaflet2017.pdf	

健康教育資源 – 乙型肝炎

類別	標題	連結	封面
影片	<u>乙肝無聲致肝癌 及早檢測及早醫</u>	https://www.youtube.com/watch?v=E7k-SSmXXfY	
海報	<u>乙肝無聲致肝癌 及早檢測及早醫</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/poster_hepatitis_B_cancer_treated_early.pdf	
單張	<u>乙型肝炎你要知</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/Pamphlet_need_to_know_hepatitis_B.pdf	

健康教育資源 – 乙型肝炎


類別	標題	連結	封面
單張	<u>慢性乙型肝炎 活得健康</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/Healthy_HepB-Pamphlet-w3c.pdf	
單張	<u>乙型肝炎口服抗病毒藥物治療</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/pamphlet-Oral-w3c.pdf	
單張	<u>乙型肝炎疫苗</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/leaflet2020_2.pdf	
海報	<u>乙型肝炎疫苗</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/poster2020_2.pdf	

健康教育資源 – 乙型肝炎

類別	標題	連結	封面
影片	<u>斷絕乙肝母嬰傳播 實現無乙肝新一代</u>	https://youtu.be/5_FFuOKVVb4	
單張	<u>預防產期前後 嬰兒感染乙型肝炎</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/leaflet2020_3.pdf	
單張	<u>斷絕乙型肝炎 母嬰傳播</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/stop-transmiss-leaflet-w3c.pdf	
單張	<u>接種疫苗後的血清 測試</u>	https://www.hepatitis.gov.hk/doc/pdf/PVST_factsheet.pdf	

健康教育資源 – 丙型肝炎

類別	標題	連結	封面
影片	<u>丙型肝炎可致肝癌 及早檢測及早醫治</u>	<u>https://youtu.be/izlHUGAS6aO</u>	
單張	<u>丙型肝炎你要知</u>	<u>https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/What_you_need_to_know_about_hep_C.pdf</u>	
單張	<u>測試丙肝 可救你一命</u>	<u>https://www.hepatitis.gov.hk/tc_chi/resources/files/Pamphlet_Getting%20Tested%20for%20Hep%20C_WCAG.pdf</u>	



Supplementary slides



世界肝炎日 7.28



IT'S TIME
TO ACT!

6 actions to protect yourself and others:



Use sterile
injections always



Practice
safer sex



Use your own
razors and blades



Use safe
tattooing, piercing
equipment



Vaccinate
infants against
hepatitis B



Know your status.
Get tested for
hepatitis B and C



每**30**秒钟就有一
人死于乙型或丙
型肝炎。

不要等待。
接受检测！





World Hepatitis Day

28 July



**IT'S TIME
TO ACT!**



things to know about viral hepatitis



5 things to know about viral hepatitis

1



**Over 3,000 people
die every day of liver
disease caused by
viral hepatitis.**



5 things to know about viral hepatitis

2



**Timely testing
and treatment of
hepatitis B, C and D
can save lives.**



5 things to know about viral hepatitis

3




**Left untreated,
hepatitis B, C and D
can lead to liver
cancer.**



5 things to know about viral hepatitis

4



**Contaminated
needles can transmit
hepatitis B, C and D.**



5 things to know about viral hepatitis

5



**Ingesting
contaminated food
and water can cause
hepatitis A and E.**



甲型肝炎流行情況

在 香港，大部分年過50歲的人士已對甲型肝炎免疫

從過往的感染中**康復** 或 已接種甲型肝炎**疫苗**

甲型肝炎病毒抗體(anti-HAV)的血清陽性率

