


乙型肝炎

乙型肝炎是什麼？




乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的肝臟疾病

急性乙型肝炎的潛伏期及病徵




潛伏期為一至六個月



急性乙型肝炎症狀通常持續數週之後會消退，亦有極少數會造成急性肝功能衰竭，甚至死亡

大部分人在急性感染期沒有任何症狀，但有些人會出現症狀，包括：



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office




衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health

乙型肝炎

乙肝無聲致肝癌
早驗早知早啲醫




① 慢性乙型肝炎屬長期疾病，患者多半沒有病徵，其肝功能驗血檢查結果也可能呈正常，故很多人並不知道自己已受到感染

② 只能透過血液測試才能得知有否感染乙型肝炎



乙型肝炎表面抗原
(HBsAg)
陽性+ / 陰性- ?

③ 如沒有定期檢查或適當治療，每四個慢性乙型肝炎患者中，有一個會死於乙型肝炎病毒感染所導致的肝衰竭或肝癌



www.hepatitis.gov.hk




控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection




乙型肝炎



你會染上乙型肝炎嗎？

① 母嬰傳播

由感染乙型肝炎的媽媽在分娩過程中傳染給新生兒是最常見的傳播途徑



在2018年，4.5%孕婦有乙型肝炎感染

2018年

4.5%

② 血液傳播

乙型肝炎病毒能通過接觸帶有乙型肝炎病毒的血液來傳播，途徑包括：



共用牙刷、刮鬍刀或指甲鉗




共用針筒針咀或其他注射用具注射毒品



開放性傷口接觸感染者之血液或體液

③ 不安全性行為

與感染乙型肝炎的性伴侶在沒有安全套的保護下進行性行為



乙型肝炎並不會通過食物或水傳播；此外，亦不會通過下列途徑傳播：

共用餐具和共同進食



打噴嚏或咳嗽

擁抱和親吻



餵哺母乳



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection




衛生署
Department of Health

乙型肝炎



乙型肝炎可預防



肝硬化




肝癌




乙型肝炎疫苗

可預防乙型肝炎病毒感染及其所引起的肝硬化和肝癌

接種乙型肝炎疫苗前應先驗血；如已有乙型肝炎抗體，表示你已有保護，毋須接種疫苗



三劑疫苗注射時間表




90-95%

接種三劑疫苗後，百分之九十至九十五的人士可以產生具保護性抗體，能長時間保護身體免受乙型肝炎病毒感染

如何保護嬰兒：



所有嬰兒要接種乙型肝炎疫苗



患有乙型肝炎媽媽所生嬰兒要接受乙型肝炎免疫球蛋白注射



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office




衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health

乙型肝炎




慢性乙型肝炎有得醫？




所有患者需定期看醫生

- 監察病毒的活躍程度和肝臟變化
- 評估藥物治療的需要
- 並非每位患者都需要藥物治療




- 藥物治療可以抑制病毒複製
- 在合適時候開始治療，可以大大降低肝臟損傷
- 減少肝硬化和肝癌的機會



保持個人健康



戒酒



不要自行服用成藥



均衡飲食，充足睡眠，
適量運動，增強抵抗力



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health