


丙型肝炎

丙型肝炎的流行情況

世界衛生組織估計全球約有**百分之**一的人口受丙型肝炎病毒感染



1%



丙型肝炎的流行情況與當地毒品使用者共用注射器具及醫護場所使用受污染注射用具的流行情況有直接關係

在香港，丙型肝炎帶病毒者人數估計約佔整體人口的**百份之零點三**，但感染率在注射毒品人士中較高



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health



丙型肝炎

丙型肝炎的傳播途徑

丙型肝炎是透過接觸感染者的血液或體液傳播




丙型肝炎不會透過食物或水，共用餐具，共同進食，擁抱或母乳餵哺傳播



丙型肝炎的傳播途徑包括：


1 母嬰傳播

- 由感染丙型肝炎的母親於分娩期間傳染給嬰兒



2 水平傳播

- 不安全的性行為，例如：與受感染的性伴侶在沒有安全套的保護下進行性行為
- 共用針筒針咀或其他注射用具
- 透過損傷皮膚、眼睛或口部的黏膜接觸感染者的血液或體液



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection




衛生署
Department of Health



丙型肝炎

急性丙型肝炎的 潛伏期及病徵

大部分患者都沒有病徵，如有的話，症狀就與其他病毒性肝炎相似，例如：



潛伏期

一般是六至九星期，
範圍在兩星期
至六個月不等



輕微發燒



黃疸、皮膚
和眼白變黃、
茶色小便




全身疲倦、
肌肉痛、頭痛



食慾不振、
噁心、嘔吐、
腹痛、腹瀉

約百分之八十的急性丙型肝炎患者，
受感染後不能完全清除病毒，有機會
成為慢性丙型肝炎患者



雖然慢性丙型肝炎患者多半沒有病徵，
但仍然有可能會出現**肝硬化和肝癌**等肝
臟疾病



www.hepatitis.gov.hk




控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health



丙型肝炎

感染丙型肝炎 風險因素




1 接觸受污染的血液
或血液製品




2 共用針咀、
針筒注射毒品



3 在醫護環境中，因工作
接觸到帶有丙型肝炎病
毒的血液、體液



4 性接觸：在沒有保護措施下肛交、多個性伴侶、
使用消遣性藥物及患有性病，例如梅毒感染



5 由帶病毒的母親於
分娩期間傳染給嬰兒



www.hepatitis.gov.hk




控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection




衛生署
Department of Health



丙型肝炎

丙型肝炎診斷及 治理方法



1 診斷丙型肝炎感染透過血液測試：
「丙型肝炎病毒抗體」(anti-HCV)及
「丙型肝炎病毒核糖核酸」(HCV RNA)

2 有藥物可以清除丙型肝炎病毒，
並大大降低肝臟損傷和肝癌的機會



3 保持個人健康，均衡飲食，
充足睡眠，適量運動，增強抵抗力



4 戒酒



5 不要自行服用成藥



6 如對甲型、乙型肝炎沒有免疫力，
應考慮接種預防疫苗



www.hepatitis.gov.hk



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health