


Hentikan Penularan Hepatitis B Dari Ibu ke Anak




Hepatitis B

Hepatitis B adalah infeksi virus. Infeksi hepatitis B (CHB) kronis yang tidak diobati adalah penyebab utama sirosis dan kanker hati.



Bayi yang Lahir dari Ibu yang Terinfeksi adalah Kelompok Berisiko Tinggi

Virus Hepatitis B (HBV) bisa ditularkan saat melahirkan dari ibu dengan CHB kepada bayinya melalui persalinan pervaginam atau operasi caesar. 90% dari bayi yang terpapar HBV saat lahir tanpa tindakan pencegahan akan berkembang menjadi CHB.



Pencegahan

Vaksin Hepatitis B

Di Hong Kong, semua bayi akan menerima serangkaian tiga dosis vaksinasi hepatitis B.



Hepatitis B Immuglobulin


Bayi yang lahir dari ibu dengan CHB akan menerima dosis tambahan hepatitis B immuglobulin (HBIG) dalam waktu 24 jam setelah lahir. Kemungkinan berkembangnya CHB pada bayi-bayi ini akan kurang dari 5%. Risiko ini lebih tinggi pada wanita hamil dengan muatan virus HBV yang tinggi ditunjukkan oleh tingkat HBV DNA di dalam darah.



Tindakan Pencegahan Tambahan

Obat Antivirus

Penggunaan obat antivirus dimulai dari masa kehamilan triwulan ketiga pada ibu dengan CHB dengan tingkat virus yang tinggi.



Tes darah bisa dilakukan untuk mengukur tingkat HBV DNA Anda. Jika tinggi, ibu bisa mempertimbangkan menggunakan tenofovir disoproxil fumarate (TDF), obat antivirus yang secara signifikan bisa menurunkan tingkat virus HBV dan mengurangi kemungkinan penularan HBV ke bayi seminimal mungkin.

Kemungkinan Efek Samping Obat Antivirus

Efek samping TDF jarang dilaporkan terjadi, ini termasuk gangguan pencernaan, sakit kepala, pening, kelelahan, nasofaringitis, sakit punggung, sulit tidur, kulit gatal, ruam kulit dan demam.



Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan obat antivirus berhubungan dengan meningkatnya risiko komplikasi saat melahirkan atau cacat lahir.

Ibu Menyusui



Tidak ada bukti yang menunjukkan penularan HBV sebagai akibat menyusui. Meskipun TDF ada dalam air susu ibu pada tingkat rendah, bukti menunjukkan bahwa penggunaan TDF oleh ibu terhadap bayi yang disusui adalah aman. Karena itu, menyusui semestinya tidak terpengaruh.

Kapan Obat Antivirus Dihentikan

Para ibu akan membutuhkan penilaian medis tentang penatalaksanaan CHB selanjutnya, apakah obat antivirus akan dilanjutkan atau dihentikan setelah melahirkan.



www.hepatitis.gov.hk

Kantor Pengendalian Virus Hepatitis Program Pencegahan Khusus
Departemen Kesehatan
Januari 2021



控制病毒性肝炎辦公室
Viral Hepatitis Control Office



衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生署
Department of Health